

# Quelex™




## Kiedy i jak stosowaliśmy Quelex™ Complex Pak w doświadczeniach?

**Quelex™ 25 g**  
+  
**Naceto™ 0,25 l/ha**

Termin stosowania:  
od fazy BBCH 11  
do BBCH 13

**Początek krzewienia**



**Powschodowo, na chwasty w niskich fazach rozwojowych (faza siewek)**

## Zakres zwalczanych chwastów uzyskany w doświadczeniach na terenie Polski oraz innych krajów europejskich

- Miotła zbożowa – **Quelex™ Complex Pak** przełamuje odporność miotły zbożowej na herbicydy o mechanizmie działania ALS (np. sulfonilomoczniki).
- Samosiewy rzepaku.
- Szeroki zakres innych chwastów dwuliściennych – **Quelex™ Complex Pak** to kompletne rozwiązanie.

Chwasty	Skuteczność
miotła zbożowa (także odporna na ALS)	+++
chaber bławatek	+++
chwasty rumianowate	+++
fiołek polny	+++
gwiazdnica pospolita	+++
jasnota różowa	+++
jasnota purpurowa	+++
mak polny	+++
maruna nadmorska (bezwonna)	+++
przetaczniki	+++
przytulia czepna	+++
samosiewy rzepaku	+++
tobołki polne	+++
bodziszek	+++

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone na etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj zasad bezpieczeństwa zamieszczonych na etykiecie. Producent nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne straty lub uszkodzenia powstałe na skutek zastosowania środka niezgodnie z zaleceniami zawartymi w instrukcji, z zasadami dobrej praktyki agronomicznej, jak również zastosowania go w warunkach nietypowych, niemożliwych do przewidzenia i pozostających poza wpływem producenta (złe przechowywanie, nieprawidłowa technika, powstanie odpornych szczepów i gatunków zwalczanych, niekorzystne warunki klimatyczne i glebowe przed, w trakcie i po zastosowaniu środka). W razie wątpliwości należy przedstawić fakturę zakupu oraz opakowanie po środku.